

# বুস্টার ডোজ তথ্য



COVID-19 বুস্টার ভ্যাকসিন 12 থেকে 17 বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত।



12 থেকে 17 বছর বয়সের জনগোষ্ঠী COVID-19 বুস্টার ডোজের জন্য যোগ্য। ডোজগুলির মধ্যে সময় এর ব্যবধান নির্ভর করে আপনি কি ধরনের ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন এবং সেইসাথে আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর। যাইহোক, বুস্টার ডোজ পাওয়ার আগে ন্যূনতম 3-6 মাসের ব্যবধান প্রস্তাবিত।



হেলথ কানাডা 12 বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের জন্য ফাইজার বায়োএনটেক কমিনাটি COVID-19 ভ্যাকসিন এর 30 এমসিজি ডোজ অনুমোদন করেছে।

হেলথ কানাডা 12 বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের জন্য মডার্না স্পাইকভ্যাক্স COVID-19 ভ্যাকসিন এর 50 এমসিজি ডোজ অনুমোদন করেছে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে ভিজিট করুন <https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/>  
অথবা কল করুন 1-833-943-3900 (TTY 1-866-797-0007). ওয়াক-ইন ক্লিনিক এবং  
অংশগ্রহণকারী ফার্মেসির মাধ্যমেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা যেতে পারে।

আরও জানতে:

[Toronto Public Health](#)  
[Ministry of Health - Ontario](#)  
[National Advisory Committee on Immunization \(NACI\)](#)



COUNCIL OF  
AGENCIES SERVING  
SOUTH ASIANS



SOUTH ASIAN  
VACCINE  
ENGAGEMENT  
COLLABORATIVE