



5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ



ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ



ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 4 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਅਣ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।



ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ:

- ਮਾਇਕਰੋਕਾਰਡਾਈਟਿਸਜਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ (ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਜ)
- -ਸਿਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (MIS-C), ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗ ਕੋਵਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼



ਗੰਭੀਰ ਥਕਾਵਟ




ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ



ਸਰੋਤ: [Toronto Public Health](https://www.toronto.ca/public-health/)



COUNCIL OF
AGENCIES SERVING
SOUTH ASIANS



SOUTH ASIAN
VACCINE
ENGAGEMENT
COLLABORATIVE